

Folheto informativo: Informação para o utilizador

AAS 150 , 150 mg + 30 mg comprimidos

Acido Acetilsalicílico + Ácido Ascórbico

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente. Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar AAS 150 com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é AAS 150 e para que é utilizado
2. Antes de tomar AAS 150
3. Como tomar AAS 150
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar AAS 150
6. Outras informações

## 1. O QUE É AAS 150 E PARA QUE É UTILIZADO

Classificação farmacoterapêutica: 2.10 – Sistema nervoso central. Analgésicos e antipiréticos.

AAS 150 está indicado para o alívio das dores ligeiras e da febre. Assim a sua utilização é recomendada nos seguintes casos: dores de cabeça, mal estar e febre que acompanham as constipações; dores de dentição e das que se seguem às avulsões; mal estar e febre que acompanham as imunizações.

## 2. ANTES DE TOMAR AAS 150

Não tome AAS 150

Crianças e adolescentes não deverão usar ácido acetilsalicílico para a varicela ou gripe devido ao potencial desenvolvimento de uma doença rara mas grave, o síndrome de Reye.

Não tomar AAS 150 se for alérgico ao ácido acetilsalicílico ou a outros salicilatos, ou se tiver asma, problemas de estômago persistentes ou recorrentes, úlceras ou hemorragias gástricas, ou se estiver a tomar medicação para a artrite, anticoagulantes, diabetes, gota, a não ser por expressa indicação do médico.

Não usar AAS 150 durante a gravidez, ou se estiver a tentar engravidar, a não ser por expressa indicação do médico.

Tome especial cuidado com AAS 150

- Não usar doses maiores que as recomendadas, nem durante mais de 3 dias.
- Se sofre de úlcera gástrica ou duodenal ou tem tendência para hemorragias, consulte o médico antes de tomar AAS 150.
- Crianças e adolescentes não deverão tomar AAS 150 sem consultar o médico.
- Se a dor de garganta for aguda, persistir por mais de dois dias e for acompanhada por febre, dor de cabeça, náusea ou vômitos consulte rapidamente o seu médico.
- Se os sintomas persistirem ou novos sintomas ocorrerem, consulte o seu médico .

Tomar AAS 150 com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Tomar AAS 150 com alimentos e bebidas

Os comprimidos têm um sabor agradável podendo ser dissolvidos na boca, mastigados ou engolidos com água, sumo ou leite.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Não use AAS 150 durante a gravidez, ou se estiver a tentar engravidar, a não ser por expressa indicação do médico.

Como em qualquer outro medicamento, se está a amamentar, só tome este medicamento após o conselho de um profissional de saúde.

Informações importantes sobre alguns componentes de AAS 150

O AAS 150 contém o corante amarelo sunset que pode causar reacções alérgicas.

### 3. COMO TOMAR AAS 150

Tomar AAS 150 sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. A dose habitual é:

Adultos e adolescentes com mais de 15 anos: Tomar 4 comprimidos de 4 em 4 horas, enquanto a dor persistir.

Não tomar mais de 20 comprimidos em 24 horas.

Crianças e adolescentes com idade inferior a 15 anos: Consultar o médico antes de tomar AAS 150.

Os comprimidos têm um sabor agradável podendo ser dissolvidos na boca, mastigados ou engolidos com água, sumo ou leite.

Se tomar mais AAS 150 do que deveria

Em caso de sobredosagem accidental, procure assistência profissional ou contacte o Centro de Informação Antivenenos (Tel: 800 250 143) imediatamente. Como procedimento de emergência recomenda-se em casos de intoxicações moderadas a ingestão de líquidos e em casos de intoxicações agudas a lavagem gástrica.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

### 4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como os demais medicamentos, AAS 150 pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Em casos de sobredosagem AAS 150 pode causar diminuição da capacidade auditiva, zumbidos dores de cabeça e tontura. Se uma reacção rara de hipersensibilidade ocorrer, o uso deste medicamento deve ser descontinuado.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

## 5. COMO CONSERVAR AAS 150

Manter fora do alcance e da vista das crianças

Não utilize AAS 150 após o prazo de validade impresso na embalagem.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

## 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de AAS 150

- As substâncias activas são o ácido acetilsalicílico (150 mg) e a vitamina C (30 mg).
- Os outros componentes são: amido, celulose microcristalina, manitol (E421), ácido esteárico, sacarina sódica, aroma de laranja artificial, corante amarelo sunset (E110) e água purificada.

Qual o aspecto de AAS 150 e conteúdo da embalagem  
Caixas de 20 comprimidos e 40 comprimidos.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

PODE SER VENDIDO SEM RECEITA MÉDICA

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare  
Produtos para a Saúde e Higiene, Lda.  
R. Dr. António Loureiro Borges n.º3  
Aquíparque Miraflores  
1495 -131 Algés

Este folheto foi aprovado pela última vez em