

## FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Dagragel 78 mg/6,5 g / 5532 mg/6,5 g Gel rectal  
Gelatina / Glicerina

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente  
Este medicamento está disponível sem prescrição médica. No entanto, precisa de utilizar  
Dagragel cuidadosamente para obter os melhores resultados.

Conserve este folheto. Pode necessitar de o ler novamente.

Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.

Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde consulte o seu médico.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários  
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Dagragel e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Dagragel
3. Como utilizar Dagragel
4. Efeitos secundários possíveis.
5. Como conservar Dagragel
6. Outras informações

### 1. O QUE É Dagragel E PARA QUE É UTILIZADO

Classificação farmacoterapêutica: 6.3.2.1.2 Aparelho Digestivo. Modificadores da  
motilidade gastrointestinal. Modificadores da motilidade intestinal. Laxantes e catárticos.  
Laxantes de contacto.

Dagragel é um laxante de contacto.

Dagragel está indicado nos casos de:

Obstipações terminais.

Preparação do tubo digestivo para intervenções cirúrgicas e exames radiológicos do  
abdómen.

Para evitar esforços de evacuação (gravidez, intervenções cirúrgicas, hérnias).

### 2. ANTES DE UTILIZAR Dagragel

Não utilize Dagragel

Se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias activas ou a qualquer outro  
componente.

Os laxantes estão contra-indicados em casos de náuseas, vômitos e dor abdominal a não ser por aconselhamento médico. As alterações dos hábitos intestinais que persistem mais do que duas semanas, devem ser avaliadas por um médico antes da utilização de laxantes. Se surgir hemorragia rectal ou ausência de dejectação após utilização do laxante deverá consultar o médico.

#### Utilizar Dagragerl com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica. Contudo, não são conhecidos casos de interacção de Dagragerl com outros medicamentos.

#### Situações em que deve ter cuidado com Dagragerl

Não estão descritas situações em que se deva ter cuidados especiais.

#### Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. Pode ser utilizado nesta situação.

#### Condução de veículos e utilização de máquinas:

Não relevante

### 3. COMO UTILIZAR Dagragerl

Aplicar uma a duas bisnagas por dia.

Se tiver dúvidas fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### Modo e via de administração

Tirar a tampa, introduzir a cânula no recto e espremer o conteúdo da bisnaga.

Pode-se molhar ou untar ligeiramente com vaselina a extremidade da cânula.

#### Momento mais favorável à administração

Deve fazer a aplicação do Dagragerl sempre que tiver prisão de ventre, antes da realização de qualquer exame ao seu intestino e em todas as situações em que seria importante evitar esforços de evacuação, tendo em atenção que o produto actua 15 a 30 minutos após aplicação.

#### Duração média do tratamento:

Nos casos de prisão de ventre a aplicação deve ser feita até à resolução do problema.

Nas situações de preparação do intestino para exames, a aplicação será feita até à realização dos respectivos exames.

Nas outras situações inerentes aos esforços de evacuação, a aplicação deverá manter-se até à resolução da mesma. Deverá no entanto consultar o seu médico se os sintomas persistirem.

Se utilizar mais Dagragerl do que deveria

Não são conhecidos casos de sobredosagem.

No entanto, no caso de ingestão acidental de Dagrager, aconselha-se que seja provocada a emése (vómito) e/ou lavagem gástrica, com acompanhamento médico. A ingestão de glicerina pode provocar cefaleias, alterações gástricas e diarreia.

Como proceder se se esquecer de utilizar Dagrager

Quando tal acontecer, deve recomeçar o tratamento logo que se lembrar. Não utilize uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de utilizar.

#### 4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como os demais medicamentos, Dagrager pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Associado à utilização de gel rectal de glicerina para o tratamento da obstipação está descrito desconforto rectal, irritação, sensação de queimadura, cólica e tenesmo (sensação constante de peso no recto e desejo de evacuar).

Se notar algum efeito adverso não descrito neste folheto, deve comunicar ao seu médico ou farmacêutico.

#### 5. COMO CONSERVAR Dagrager

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Dagrager após o prazo de validade impresso no rótulo da embalagem exterior, a seguir à abreviatura utilizada para o prazo de validade. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize Dagrager se verificar sinais visíveis de deterioração.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

#### 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Dagrager

As substâncias activas são a gelatina e a glicerina. Cada grama de gel rectal contém 12 mg de gelatina e 851,077 mg de glicerina.

O outro componente é a água purificada.

Qual o aspecto de Dagrager e conteúdo da embalagem

APROVADO EM 12-07-2019 INFARMED
---------------------------------------

Dagragel apresenta-se na forma farmacêutica de gel rectal, translúcido, fluído, acondicionado em bisnaga de polietileno de baixa densidade (LDPE), com cânula incorporada.

Cada bisnaga contém 6,5 g de gel rectal.

Embalagem contendo 6 bisnagas com 6,5 g de gel rectal.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado  
BGP Products, Unipessoal Lda.  
Av. D. João II, Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4  
1990-095 Lisboa  
Portugal

Fabricante  
Sidefarma, Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A.  
Rua da Guiné, nº 26  
2689-514 Prior Velho  
Portugal

Medicamento não sujeito a receita médica

Este folheto foi aprovado pela última vez em: