

APROVADO EM 13-01-2005 INFARMED
---------------------------------------

**Folheto Informativo**

## Faktu® Anotamp

**Apresentação:**

O Faktu Anotamp apresenta-se em embalagens de 10 supositórios.

**Composição**

1 supositório contém:

Policresulen

100 mg

Cloridrato de Cinchocaína

2,5 mg

**Forma Farmacêutica:** supositórios.

*Tratamento das hemorróidas e outras afecções ano-rectais.*

*Faktu Anotamp, são supositórios providos de uma gaze tampão, o que permite a sua colocação correcta no canal anal, onde permanece até se dissolver completamente. Assim, o efeito terapêutico de Faktu Anotamp exerce-se, exclusivamente no canal anal.*

*O Faktu Anotamp mostrou-se eficaz nas afecções ano-rectais devido às suas propriedades adstringentes, bactericidas e hemostáticas. O Policresulen, princípio activo de Faktu exerce uma acção selectiva sobre os tecidos necrosados, sem influenciar as células sãs. Os tecidos patológicos são coagulados e eliminados. Sob a influência de Faktu as feridas recobrem-se de uma fina camada de albumina desnaturada e os pequenos vasos sanguíneos contraem-se e fecham, parando rapidamente as hemorragias. Surge uma hiperemia reactiva que acelera o processo de regeneração. Devido ao seu efeito bactericida, Faktu impede que os germes patogénicos se instalem, evitando e eliminando as inflamações. A Cinchocaína mostrou-se eficaz, em proctologia, como anestésico local, suprimindo a dor e o prurido.*

*Nos casos de hemorróidas ou de outras afecções ano-rectais, Faktu elimina rapidamente a hemorragia a exsudação e o prurido, impede as inflamações e favorece a regeneração dos tecidos patológicos.*

**Detentor da AIM:**

Produtos Farmacêuticos ALTANA Pharma, Lda.

Quinta da Fonte - Edifício Gil Eanes

Porto Salvo

2770-192 Paço de Arcos

**Indicações terapêuticas**

Hemorróidas internas, sobretudo quando acompanhadas de inflamação e hemorragia superficial. Fissuras e rágadas anais. Prurido e eczema anais. Terapêutica pós-operatória.

**Contra-indicações**

APROVADO EM 13-01-2005 INFARMED
---------------------------------------

A administração de Faktu está contra-indicada em casos de hipersensibilidade conhecida à cinchocaína, policresulen ou a qualquer um dos constituintes do medicamento.

#### **Efeitos secundários**

No início do tratamento podem surgir efeitos secundários locais, sob a forma de sensação de queimadura e de prurido. Estão relacionadas com o mecanismo de acção do produto mas, o mais frequente, é desaparecerem em pouco tempo. Em geral, não é necessário suspender a terapêutica.

#### **Interacções Medicamentosas e outras**

Não convém administrar na mesma lesão qualquer outro medicamento tópico, dado que não se pode excluir a possibilidade de interacção.

#### **Precauções especiais de utilização**

Em caso de hipersensibilidade à cinchocaína, Faktu Anotamp só deve ser utilizado com autorização expressa do médico.

#### **Efeitos em grávidas e lactentes**

O Policresulen só deve ser administrado durante a gravidez, por expressa indicação médica, se os benefícios para a mãe justificarem os possíveis riscos para o feto.

Não se dispõe de ensaios clínicos relativamente à segurança da utilização do policresulen durante a gravidez na mulher. Os estudos realizados em animais não evidenciaram quaisquer indícios de efeitos teratogénicos.

Desconhece-se se o Policresulen é excretado no leite materno. Consequentemente, a utilização de Faktu em mulheres a amamentar não é aconselhável, excepto se os benefícios justificarem os possíveis riscos para o recém-nascido.

#### **Efeitos sobre a capacidade de condução e a utilização de máquinas**

Não têm sido referidos efeitos sobre a capacidade de condução e a utilização de máquinas.

#### **Posologia**

Via de Administração: Rectal

Salvo indicação médica em contrário, a posologia proposta é de 1 supositório, 2-3 vezes por dia (de manhã, à noite e, se for necessário, após defecação).

Retirar o supositório do invólucro.

O supositório deve ser introduzido no ânus e, puxando ligeiramente pela gaze, colocado correctamente na região do esfíncter, onde deve permanecer tanto tempo quanto possível.

#### **Sobredosagem, sintomas, medidas de urgência e antídotos**

Não foram referidos até à data quaisquer casos de sobredosagem com Faktu.

#### **Precauções especiais de conservação:**

Guardar em lugar fresco, a temperatura não superior a 25°C.

Possíveis alterações na cor da pomada ou dos supositórios, assim como o aparecimento de manchas amareladas nos supositórios não têm qualquer influência na eficácia do produto.

APROVADO EM 13-01-2005 INFARMED
---------------------------------------

Caso se registre a ocorrência de outros efeitos, não descritos neste folheto, deve comunicá-los ao seu médico ou farmacêutico.

Verifique o prazo de validade inscrito na embalagem e não utilizar para além da data indicada.

Medicamento Manter fora do alcance das crianças

Data da última revisão deste folheto: Fevereiro de 2005