

FOLHETO INFORMATIVO

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Kompensan-S, 340 mg + 30 mg, comprimidos para chupar
Carbonato de di-hidróxido de alumínio e sódio + Dimeticone

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar Kompensan-S com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após uma semana, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Kompensan-S e para que é utilizado
2. Antes de tomar Kompensan-S
3. Como tomar Kompensan-S
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Kompensan-S
6. Outras informações

1. O QUE É KOMPENSAN-S E PARA QUE É UTILIZADO

Kompensan-S é um medicamento que combina a acção de um agente que neutraliza a acidez do estômago (carbonato de di-hidróxido de alumínio e sódio), com a acção de um agente que diminui a acumulação de gases nos seus intestinos (dimeticone).

Kompensan-S está indicado no alívio dos seguintes sintomas gastrointestinais:

- azia (sensação de queimadura no estômago) e enfartamento devidos à produção excessiva de ácido no estômago;
- gases (flatulência, aerofagia e meteorismo).

2. ANTES DE TOMAR KOMPENSAN-S

Não tome Kompensan-S

- se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias activas ou a qualquer outro componente de Kompensan-S;
- se tem insuficiência renal;
- se está a fazer uma dieta com restrição de sal;
- se o seu nível de fosfato no sangue é baixo (hipofosfatemia);
- se sofre de prisão de ventre e tem um estreitamento do intestino (estenose).

Tome especial cuidado com Kompensan-S

Os doentes que façam diálise só devem tomar Kompensan-S quando indicado pelo médico, uma vez que Kompensan-S contém alumínio;
O uso prolongado de Kompensan-S pode diminuir os seus níveis sanguíneos de fósforo.

Ao tomar Kompensan-S com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Se for administrado em simultâneo, Kompensan-S pode diminuir a absorção dos antibióticos da classe das tetraciclinas.

Tendo em conta uma possível diminuição da absorção, deve considerar-se um intervalo de uma a duas horas entre a administração de antiácidos e de outros fármacos.

Ao tomar Kompensan-S com alimentos e bebidas

O ácido contido em algumas bebidas (sumo de fruta ou vinho) pode aumentar a absorção de alumínio no intestino.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Kompensan-S apenas deve ser administrado a mulheres grávidas ou a amamentar com indicação do médico.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Os efeitos de Kompensan-S sobre a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas são nulos ou desprezíveis.

Informações importantes sobre alguns componentes de Kompensan-S

Este medicamento contém sacarose. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Este medicamento contém 2,36 mmol (ou 54,31 mg) de sódio por comprimido para chupar. Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão controlada de sódio.

3. COMO TOMAR KOMPENSAN-S

Tome Kompensan-S sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose habitual de Kompensan-S é de 1 ou 2 comprimidos para chupar entre ou após as refeições, ao deitar ou se os sintomas assim o exigirem.

Os comprimidos para chupar deverão ser dissolvidos na boca e não devem ser engolidos.

Os comprimidos para chupar não devem ser dissolvidos em água.

Não está estabelecido um período médio de tratamento. Recomenda-se consultar o médico se os sintomas persistirem mais de uma semana após iniciado o tratamento.

Utilização em crianças

Kompensan-S não é recomendado em crianças com idade inferior a 12 anos.

Se tomar mais Kompensan-S do que deveria

Não se conhecem casos de sobredosagem.

Se acidentalmente uma criança ingerir Kompensan-S, deverá contactar imediatamente um médico ou dirigir-se ao hospital mais próximo.

Caso se tenha esquecido de tomar Kompensan-S

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Kompensan-S pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Em caso de utilização prolongada de doses elevadas de Kompensan-S, é possível que ocorram os seguintes efeitos secundários:

redução dos níveis de fósforo no sangue;

aparecimento de depósitos de alumínio nos tecidos ósseo e nervoso;

prisão de ventre (obstipação).

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR KOMPENSAN-S

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Conservar na embalagem de origem para proteger da humidade.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Kompensan-S após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize Kompensan-S se verificar sinais visíveis de deterioração.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Kompensan-S

- As substâncias activas são: carbonato de di-hidróxido de alumínio e sódio e dimeticone. Cada comprimido para chupar contém 340 mg de carbonato de di-hidróxido de alumínio e sódio e 30 mg de dimeticone.
- Os outros componentes são: carbonato de cálcio, sacarose, goma adraganta, mentol, óleo essencial de hortelã-pimenta e estearato de magnésio.

Qual o aspecto de Kompensan-S e conteúdo da embalagem

Kompensan-S apresenta-se sob a forma de comprimido para chupar.

Kompensan-S está disponível em embalagens com 20 e com 60 comprimidos para chupar.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Johnson & Johnson, Lda.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena

Portugal

Fabricante

Janssen-Cilag, S.A.

Domaine de Maigremont

F-27100 Val de Reuil

França

Este folheto foi aprovado pela última vez em