

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Canespor 10 mg/ml solução para pulverização cutânea
Bifonazol

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Canespor com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Canespor solução para pulverização cutânea e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Canespor solução para pulverização cutânea
3. Como utilizar Canespor solução para pulverização cutânea
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Canespor solução para pulverização cutânea
6. Outras informações

1. O QUE É CANESPOR SOLUÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO CUTÂNEA E PARA QUE É UTILIZADO

Canespor solução para pulverização cutânea contém a substância activa bifonazol pertencente a um grupo de substâncias conhecidas como "antifúngicos".

O bifonazol possui um amplo espectro de actividade o que lhe permite a eliminação eficaz de um grande número de fungos, responsáveis por várias doenças da pele (dermatomicoses) localizadas nas mãos e pés. Também é eficaz em outras afecções fúngicas cutâneas, nomeadamente a pitiríase versicolor.

Canespor solução para pulverização cutânea é utilizado para tratamento local de várias infecções fúngicas, nomeadamente:

- Micoses das mãos e pés (conhecido por "pé de atleta");
- Pitiríase versicolor (micose caracterizada por manchas esbranquiçadas no tórax e abdómen).

2. ANTES DE UTILIZAR CANESPOR SOLUÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO CUTÂNEA

Não utilize Canespor solução para pulverização cutânea

- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao bifonazol ou a qualquer outro componente do medicamento.

Tome especial cuidado com Canespor solução para pulverização cutânea

Se já teve de reacções alérgicas a outros medicamentos anti-fúngicos imidazólicos (por ex., econazol, clotrimazol, miconazol), deve utilizar medicamentos contendo bifonazol com cuidado.

Evitar o contacto com os olhos.

Canespor solução pode ser aplicado em pessoas idosas.

Ao utilizar Canespor solução para pulverização cutânea com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar ou tiver utilizado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Não se conhecem alterações do efeito de Canespor solução para pulverização cutânea pelo facto de se tomarem outros medicamentos.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar qualquer medicamento.

Nos três primeiros meses de gravidez, em mulheres que estão a amamentar e em crianças pequenas (bebés) Canespor solução para pulverização cutânea só deverá ser utilizado sob recomendação médica.

Durante o período de aleitamento, o bifonazol não deverá ser aplicado na área peitoral.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

3. COMO UTILIZAR CANESPOR SOLUÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO CUTÂNEA

Utilizar Canespor solução para pulverização cutânea sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Canespor solução para pulverização cutânea deverá ser aplicado uma vez por dia, de preferência à noite, na zona a tratar, em pequena quantidade, friccionando ligeiramente.

Para tratar uma área correspondente à da palma da mão é geralmente suficiente premir 1 ou 2 vezes o atomizador.

Para obter uma cura duradoura, o tratamento com Canespor solução para pulverização cutânea deve ser efectuado de modo adequado e durante os períodos de tratamento indicados (pelo seu médico) que são, normalmente, os seguintes:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Micoses do pé e mão, pé-de-atleta: | 3 semanas |
| Pitiríase versicolor: | 2 semanas |

Se os sintomas piorarem ou se persistirem para além do tempo sugerido de tratamento, poderá ter uma situação médica que requer tratamento por um médico.

Caso se tenha esquecido de utilizar Canespor solução para pulverização cutânea

Não utilize maiores quantidades de Canespor solução para pulverização cutânea para compensar uma dose que se esqueceu de aplicar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Canespor solução para pulverização cutânea pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Pode verificar-se:

- Dor no local de administração, inchaço em redor do local de administração;
- Erupção cutânea que surge do contacto de uma substância com a sua pele (dermatite de contacto, dermatite alérgica), vermelhidão, comichão, erupção cutânea, vesiculação, esfoliação cutânea, eczema, pele seca, irritação cutânea, maceração cutânea, sensação de queimadura cutânea.

Estes efeitos são de natureza passageira e desaparecem quando o tratamento é interrompido ou concluído.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR CANESPOR SOLUÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO CUTÂNEA

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Canespor solução para pulverização cutânea após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após "VAL."

Não utilize Canespor solução para pulverização cutânea se verificar sinais visíveis de deterioração.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Canespor solução para pulverização cutânea

- A substância activa é o bifonazol. Cada mililitro de solução para pulverização cutânea contém 10 mg de bifonazol.
- Os outros componentes são: etanol e miristato de isopropilo.

Qual o aspecto de Canespor solução para pulverização cutânea e conteúdo da embalagem

Canespor solução para pulverização cutânea apresenta-se na forma de solução para pulverização cutânea incolor.

Encontra-se disponível em frasco atomizador com 15 ml de solução para pulverização cutânea.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Bayer Portugal, S.A.
Rua Quinta do Pinheiro, n.º 5
2794-003 Carnaxide
Portugal

Fabricante

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Strasse, 324
D-24106 Kiel
Alemanha

Este folheto foi aprovado pela última vez em